

Tragli Green

FICHA TÉCNICA

HERBICIDA

Características: es un herbicida de absorción foliar, no selectivo, para el control de gramíneas y dicotiledóneas anuales y perennes. El producto se absorbe por las hojas y se transporta hacia el sistema radicular. Por esta razón, es importante tratar las malas hierbas con sus hojas bien desarrolladas.

Composición: Glifosato 36 % (Sal isopropilamina, UL) (P/V)

Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Nº de Registro: ES-00699

Uso y dosis autorizados

USO	AGENTE	DOSIS	APLIC	VOL CALDO
Aguacates, cítricos forestales y ornamentales	Dicotiledóneas anuales			
leñosas, frutales cascara, hueso y pepita, kiwi, mango	Dicotiledóneas plurianuales	3 - 5 l/ha	1	100 - 400 l/ha
olivo verdeo, platanera, vid	Monocotiledóneas anuales			
Olivo de almazara	Monocotiledóneas plurianuales			
		3 l/ha		
Condicionamientos				
Aplicar solo en especímenes verticales desarrollados mayores de 3-4 años.				
Las aplicaciones se realizan alrededor de la base del tronco y en las líneas internas (franjas internas entre dos árboles dentro de una línea).				
Aplicar máximo a un 50% del área tratada.				
Se debe evitar todo posible contacto de los frutos con el producto o con la tierra tratada.				
Aplicar cuando las malas hierbas están en crecimiento activo.				
Herbáceas extensivas	Dicotiledóneas anuales			
Herbáceas intensivas	Dicotiledóneas plurianuales	1,5 - 2,5 l/ha	1	100 - 400 l/ha
	Monocotiledóneas anuales			
	Monocotiledóneas plurianuales			
Condicionamientos				
Aplicar únicamente en pre-siembra de los cultivos cuando las malas hierbas están en crecimiento				
Linderos	Mono y dicotiledoneas plurianua	5 l/ha	1	100 - 400 l/ha
Solo para aplicación localizada. Dosis: 5-10%. Aplicar máximo a un 50% del área tratada.				
Praderas naturales y siembra	Malas hierbas leñosas	1,5-2,5 l/ha	1	100 - 400 l/ha
Condicionamientos				
Solo para aplicación localizada. Dosis: 5-10%.				
Se debe evitar la alimentación del ganado cuando el producto es utilizado para la renovación de los pastizales				

Plazo Seguridad:

Aguacate, Cítricos, Forestales y ornamentales leñosas, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Kiwi, Mango, Olivo de almazara, Olivo de verdeo, Platanera, Vid es de 7 días

Herbáceas extensivas, Herbáceas intensivas, Praderas de siembra, Praderas naturales, Linderos NO PROCEDE

Herbicida de aplicación dirigida al suelo. El preparado no debe aplicarse directamente sobre las partes verdes de las hojas y tallos de las plantas tratadas. Se recomienda realizar programas de monitoreo posteriores al registro. No aplicar durante lluvias intensas. La lluvia después de la aplicación reduce la eficacia. Se debe prestar especial atención para evitar cualquier deriva de la pulverización sobre los cultivos tratados y adyacentes. Para evitar efectos de fitotoxicidad, el producto debe usarse solo en ausencia de viento y empleando un material de pulverización apropiado y bien ajustado

BRANDT EUROPE, S.L.

Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1

41410 Carmona (Sevilla)

Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

